



Centers for Disease Control and Prevention
CDC 24/7: Saving Lives, Protecting People™

Control de infecciones

Guía para precauciones de aislamiento: prevención de la transmisión de agentes infecciosos en entornos de atención médica (2007- 2017)

Tipo y duración de las precauciones recomendadas para determinadas infecciones y afecciones

Actualizaciones del Apéndice A [septiembre de 2018]

NOTA: las actualizaciones se producen en forma periódica en el sitio web del CDC: www.cdc.gov

(Actualizaciones del Apéndice A)

Para poder actualizar en el futuro se ha respetado el orden alfabético del CDC aunque en español muchas letras no resulten coincidentes con los nombres de las enfermedades

A

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Absceso Drenaje mayor	P. de Contacto + P. Estándar	Mientras dure la enfermedad	Hasta que el drenaje se detenga o se pueda contener con vendajes
Absceso Drenaje leve o limitado	P. Estándar		Si el apósito cubre y contiene el drenaje
Síndrome de la inmunodeficiencia humana adquirida (HIV)	P. Estándar		Quimioprofilaxis posterior a la exposición para algunas exposiciones a la sangre
Actinomicosis	P. Estándar		No se transmite de persona a persona

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Infección por adenovirus (ver guía específica del agente en Gastroenteritis , Conjuntivitis , Neumonía)			
Amebiasis	P. Estándar		La transmisión de persona a persona es poco frecuente. Se ha reportado transmisión en entornos para personas con problemas mentales y en un grupo familiar. Tener cuidado al manipular a los bebés con pañales y a las personas con problemas mentales

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Ántrax	P. Estándar		Por lo general, los pacientes infectados no representan un riesgo de transmisión.
Ántrax cutáneo	P. Estándar		Es posible la transmisión a través del contacto de la piel no intacta con lesiones que supuran, por lo tanto, use Precauciones de Contacto si hay una gran cantidad de drenaje no contenido. Lavarse las manos con agua y jabón es preferible al uso de antisépticos a base de alcohol sin agua, ya que el alcohol no tiene actividad esporicida

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Ántrax pulmonar	P. Estándar		No se transmite de persona a persona
Ántrax ambiental: polvo u otra sustancia que contiene esporas en aerosol		Hasta que el medio ambiente esté completamente descontaminado	Hasta que se complete la descontaminación del medio ambiente. Usar respirador (N95 o PAPR), ropa protectora; descontaminar a las personas con polvo Higiene de manos: Lavarse las manos durante 30-60 segundos con agua y jabón o gluconato de clorhexidina al 2% después del contacto con las esporas (los productos para la higiene de manos con alcohol son inactivos contra las esporas). Profilaxis posterior a la exposición después de la exposición ambiental: 60 días de tratamiento con antimicrobianos (doxiciclina, ciprofloxacina o levofloxacina) y vacuna posterior a la exposición bajo IND.

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Colitis asociada a antibióticos (ver Clostridium difficile)			
Transmitido por artrópodos: • Encefalitis víricas (encefalomielitis equina venezolana, oriental, occidental; Encefalitis de San Luis, California; Virus del Nilo Occidental) y • Fiebres virales (dengue, fiebre amarilla, fiebre por garrapatas de Colorado)	P. Estándar		No se transmite de persona a persona, excepto raramente por transfusión, y para el virus del Nilo Occidental por trasplante de órganos, leche materna o transplacentaria. Instalar mosquiteros en ventanas y puertas en zonas endémicas. Usar repelentes de mosquitos y ropa que contengan DEET (N,N-Dietil-m-toluamida) para cubrir las extremidades.

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Ascariasis	P. Estándar		No se transmite de persona a persona
Aspergilosis	P. Estándar		Precauciones de contacto y en el aire si se requiere una infección masiva de tejidos blandos con drenaje copioso y riegos repetidos

B

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Babebiosis	P. Estándar		No se transmite de persona a persona, excepto en raras ocasiones por transfusión
Blastomycosis norteamericana, cutánea o pulmonar	P. Estándar		No se transmite de persona a persona
Botulismo	P. Estándar		No se transmite de persona a persona
Bronquiolitis (ver Infecciones respiratorias en lactantes y niños pequeños)	P. de Contacto + P. Estándar	Mientras dure la enfermedad	Usar máscara, mascarilla o barbijo quirúrgico de acuerdo con las Precauciones Estándar.

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Brucelosis (ondulante, Malta, fiebre mediterránea)	P. Estándar		No se transmite de persona a persona, excepto raramente a través de espermatozoides en bancos y contacto sexual Proporcionar profilaxis antimicrobiana después de la exposición en el laboratorio

C

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Gastroenteritis <i>por Campylobacter</i> (ver Gastroenteritis)			
Candidiasis, en todas sus formas, incluida la mucocutánea	P. Estándar		
Fiebre por arañazo de gato (linfeticosis benigna por inoculación)	P. Estándar		No se transmite de persona a persona
Celulitis	P. Estándar		Usar máscara, mascarilla o barbijo quirúrgico de acuerdo con las Precauciones Estándar.

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Chancroide (chancro blando) (<i>H. ducreyi</i>)	P. Estándar		Se transmite sexualmente de persona a persona.
<i>Chlamydia trachomatis</i> Conjuntivitis	P. Estándar		
<i>Chlamydia trachomatis</i> Genital (linfogranuloma venéreo)	P. Estándar		
<i>Chlamydia trachomatis</i> Neumonía (bebés ≤ 3 meses de edad)	P. Estándar		
<i>Chlamydia pneumoniae</i>	P. Estándar		Rara vez se han notificado brotes en poblaciones institucionalizadas

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Cólera (ver Gastroenteritis)			
Infección de cavidad cerrada Desagüe abierto en su lugar; Drenaje limitado o menor	P. Estándar		Utilizar Precauciones de Contacto si hay abundante drenaje no contenido.
Infección de cavidad cerrada No hay desagüe o sistema de drenaje cerrado en su lugar	P. Estándar		
<i>Clostridium botulinum</i>	P. Estándar		No se transmite de persona a persona

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
<i>Clostridium difficile</i> (ver Gastroenteritis , <i>C. difficile</i>)	P. de Contacto + P. Estándar	Mientras dure la enfermedad	
<i>Clostridium perfringens</i> Intoxicación alimentaria	P. Estándar		No se transmite de persona a persona
<i>Clostridium perfringens</i> Gangrena gaseosa	P. Estándar		La transmisión de persona a persona es poco frecuente; se ha notificado 1 brote en un entorno quirúrgico. Usar Precauciones de Contacto si el drenaje de la herida es extenso

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Coccidioidomicosis (fiebre del valle) Lesiones drenantes	P. Estándar		No se transmite de persona a persona, excepto en circunstancias extraordinarias (porque la forma artroconidial infecciosa de <i>Coccidioides immitis</i> no se produce en humanos)
Coccidioidomicosis (fiebre del valle) Neumonía	P. Estándar		No se transmite de persona a persona, excepto en circunstancias extraordinarias (por ejemplo, inhalación de endosporas en fase de tejido en aerosol durante la necropsia, trasplante de pulmón infectado) porque la forma artroconidial infecciosa de <i>Coccidioides immitis</i> no se produce en humanos
Fiebre por garrapatas de Colorado	P. Estándar		No se transmite de persona a persona

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Rubéola congénita	P. de Contacto + P. Estándar	Hasta 1 año de edad	Precauciones Estándar si los cultivos nasofaríngeos y de orina son negativos repetidamente después de los 3 meses de edad
Conjuntivitis Bacterias agudas	P. Estándar		
Conjuntivitis Bacterias agudas <i>Clamidia</i>	P. Estándar		No se transmite de persona a persona
Conjuntivitis Bacterias agudas Gonocócica	P. Estándar		

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Conjuntivitis Viral aguda (hemorrágica aguda)	P. de contacto + P. Estándar	Mientras dure la enfermedad	Adenovirus (más común); enterovirus, virus Cocksackie A24, también asociados con brotes comunitarios. Altamente contagioso; brotes en clínicas oftalmológicas, entornos pediátricos y neonatales, y se informó de entornos institucionales. Las clínicas oftalmológicas deben seguir las P. Estándar al tratar a pacientes con conjuntivitis. El uso rutinario de medidas de control de infecciones en el manejo de instrumentos y equipos evitará la aparición de brotes en este y otros entornos

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Coronavirus asociado al SARS (SARS-CoV) (ver Síndrome respiratorio agudo severo)			
Enfermedad por el virus de Coxsackie (ver infección por enterovirus)			
Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (ECJ, vECJ)	P. Estándar		Usar instrumentos desechables o esterilización/desinfección especial para superficies, objetos contaminados con tejido neural si se sospecha de ECJJ o vECJ y no se ha R/O; No hay procedimientos especiales de entierro.

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	Comentarios
Crup (ver Infecciones respiratorias en lactantes y niños pequeños)			
Fiebre de Crimea-Congo (ver Fiebre hemorrágica viral)	P. Estándar		
Criptococosis	P. Estándar		No se transmite de persona a persona, excepto en raras ocasiones a través de trasplante de tejido y córnea
Criptosporidiosis (ver Gastroenteritis)			

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Cisticercosis	P. Estándar		No se transmite de persona a persona
Infección por citomegalovirus, incluso en neonatos y pacientes inmunodeprimidos	P. Estándar		No hay precauciones adicionales para las trabajadoras de salud embarazadas.

D

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Úlcera por decúbito (ver Úlcera por presión)			
Dengue	P. Estándar		No se transmite de persona a persona
Diarrea con sospecha de etiología aguda- infecciosa (ver Gastroenteritis)			
Difteria Cutánea	P. de Contacto + P. Estándar	Hasta que deje el tratamiento antimicrobiano y el cultivo sea negativo	Hasta 2 cultivos negativos tomados con 24 horas de diferencia

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Difteria Faríngea	P. por Gotas + P. Estándar	Hasta que deje el tratamiento antimicrobiano y el cultivo sea negativo	Hasta 2 cultivos negativos tomados con 24 horas de diferencia

E

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Virus del Ébola (ver Fiebres hemorrágicas virales)			Enfermedad por el virus del Ébola para trabajadores de la salud [2014] Actualización: Las recomendaciones para los trabajadores de la salud se pueden encontrar en Ébola para médicos. (consultado en septiembre de 2018).
Equinococosis (hidatidosis)	P. Estándar		No se transmite de persona a persona
Echovirus (ver Infección por enterovirus)			
Encefalitis o encefalomielitis (ver agentes etiológicos específicos)			

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	Comentarios
Endometritis (endometriometritis)	P. Estándar		
Enterobiasis (oxiuros, oxiuriasis)	P. Estándar		
<i>Especies de enterococos</i> (ver Microorganismos multirresistentes si son epidemiológicamente significativos o resistentes a la vancomicina)			
Enterocolitis por <i>C. difficile</i> (ver Gastroenteritis por C. difficile)			

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Infecciones enterovirales (es decir, virus Coxsackie de los grupos A y B y virus Echo) (no incluye el virus de la poliomielitis)	P. Estándar		Usar Precauciones de Contacto para niños con pañales o incontinentes mientras dure la enfermedad y para controlar los brotes institucionales.
Epiglotitis por <i>Haemophilus</i> <i>influenzae</i> tipo b	P. por Gotas + P. Estándar	Hasta 24 horas después del inicio de la terapia efectiva	Ver agentes patógenos específicos para la epiglotitis por otras etiologías.
Infección por el virus de Epstein-Barr, incluida la mononucleosis infecciosa	P. Estándar		

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Eritema infeccioso (ver también Parvovirus B19)			
Gastroenteritis por <i>Escherichia coli</i> (ver Gastroenteritis)			

F

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Intoxicación alimentaria Botulismo	P. Estándar		No se transmite de persona a persona
Intoxicación alimentaria C. perfringens o welchii	P. Estándar		No se transmite de persona a persona
Intoxicación alimentaria Estafilocócica	P. Estándar		No se transmite de persona a persona
Furunculosis Estafilocócica	P. Estándar		Usar Precauciones de Contacto si el drenaje no está controlado. Seguir las políticas institucionales si tiene SAMR

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Furunculosis Estafilocócica Infantes y niños pequeños	P. por Contacto + P. Estándar	Mientras dure la enfermedad (con lesiones en las heridas, hasta que las heridas dejen de drenar)	

G

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Gangrena (gangrena gaseosa)	P. Estándar		No se transmite de persona a persona
Gastroenteritis	P. Estándar		Utilizar Precauciones de Contacto para personas con pañales o incontinentes mientras dure la enfermedad o para controlar los brotes institucionales de gastroenteritis causados por todos los agentes siguientes
Gastroenteritis Adenovirus	P. Estándar		Utilizar Precauciones de Contacto para personas con pañales o incontinentes mientras dure la enfermedad o para controlar los brotes institucionales

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Gastroenteritis <i>Campylobacter species</i>	P. Estándar		Utilizar Precauciones de Contacto para personas con pañales o incontinentes mientras dure la enfermedad o para controlar los brotes institucionales
Gastroenteritis Cholera (<i>Vibrio cholerae</i>)	P. Estándar		Utilizar Precauciones de Contacto para personas con pañales o incontinentes mientras dure la enfermedad o para controlar los brotes institucionales

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Gastroenteritis <i>C. difficile</i>	P. de Contacto + P. Estándar	Mientras dure la enfermedad	Suspender los antibióticos si corresponde. No compartir termómetros electrónicos; garantizar una limpieza y desinfección ambiental constante. Es posible que se requieran soluciones de hipoclorito para la limpieza si la transmisión continúa. Se prefiere el lavado de manos con agua y jabón debido a la ausencia de actividad esporicida del alcohol en los desinfectantes antisépticos sin agua

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Gastroenteritis <i>Cryptosporidium species</i>	P. Estándar		Utilizar Precauciones de Contacto para personas con pañales o incontinentes mientras dure la enfermedad o para controlar los brotes institucionales (a)
Gastroenteritis <i>E. coli</i> O157:H7 enteropatógena y otras cepas productoras de toxina Shiga	P. Estándar		Ídem (a)
Gastroenteritis Otras especies de <i>E. coli</i>	P. Estándar		Ídem (a)
Gastroenteritis <i>Giardia lamblia</i>	P. Estándar		Ídem (a)

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	Comentarios
Gastroenteritis Norovirus	P. de Contacto + P. Estándar		Utilizar P. de Contacto durante un mínimo de 48 horas después de la resolución de los síntomas o para controlar brotes institucionales. Las personas que limpian áreas muy contaminadas con heces o vómitos pueden beneficiarse del uso de máscaras, mascarillas o barbijos quirúrgicos, ya que estas sustancias corporales pueden aerosolizar el virus; garantizar una limpieza y desinfección ambiental constante, centrándose en los baños, incluso cuando aparentemente no estén sucios.

Continúa en cuadro siguiente ►

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Gastroenteritis <i>Rotavirus</i>	P. de Contacto + P. Estándar	Mientras dure la enfermedad	Garantizar una limpieza y desinfección ambiental constante y la eliminación frecuente de los pañales sucios. La eliminación prolongada de rotavirus puede ocurrir tanto en niños inmunocompetentes como en niños inmunocomprometidos y en ancianos
Gastroenteritis <i>Salmonella</i> species (incluyendo <i>S. typhi</i>)	P. Estándar		Utilizar Precauciones de contacto para personas con pañales o incontinentes durante la duración de la enfermedad o para controlar brotes institucionales.

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Gastroenteritis <i>Shigella</i> species (Disentería bacilar)	P. Estándar		Utilizar Precauciones de contacto para personas con pañales o incontinentes durante la duración de la enfermedad o para controlar brotes institucionales (a)
Gastroenteritis <i>Vibrio parahaemolyticus</i>	P. Estándar		Ídem (a)
Gastroenteritis <i>Viral</i> (si no <i>está clasificado en otra parte</i>)	P. Estándar		Ídem (a)
Gastroenteritis <i>Yersinia enterocolitica</i>	P. Estándar		Ídem (a)

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Oftalmia neonatal gonocócica (oftalmía gonocócica, conjuntivitis aguda del recién nacido)	P. Estándar		
Gonorrea	P. Estándar		
Granuloma inguinal (Donovanosis, granuloma venéreo)	P. Estándar		
Síndrome de Guillain-Barré	P. Estándar		No es una condición infecciosa

H

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
<i>Haemophilus influenzae</i> (Ver recomendaciones específicas de la enfermedad)			
Enfermedad de manos, pies y boca (ver Infección por enterovirus)			
Enfermedad de Hansen (ver Lepra)			
Síndrome pulmonar por Hantavirus	P. Estándar		No se transmite de persona a persona
<i>Helicobacter pylori</i>	P. Estándar		

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Hepatitis, viral. Tipo A	P. Estándar		Proporcionar la vacuna contra la hepatitis A después de la exposición según lo recomendado
Hepatitis, viral. Tipo A Pacientes con pañales o incontinentes	P. de Contacto + P. Estándar		Mantener las precauciones de contacto en bebés y niños menores de 3 años de edad durante la hospitalización; para niños de 3 a 14 años de edad durante 2 semanas después de la aparición de los síntomas; mayores de 14 años, durante 1 semana después de la aparición de los síntomas

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Hepatitis, viral. Tipo B- HBsAg positivo; aguda o crónica	P. Estándar		Ver recomendaciones específicas para la atención de pacientes en centros de hemodiálisis.
Hepatitis, viral Tipo C y otras no especificadas no A, No B	P. Estándar		Ver recomendaciones específicas para la atención de pacientes en centros de hemodiálisis.
Hepatitis, viral Tipo D (visto solo con Hepatitis B)	P. Estándar		
Hepatitis, viral Tipo E	P. Estándar		Utilizar P. de contacto para personas con pañales o incontinentes durante la duración de la enfermedad

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Hepatitis, viral Tipo G	P. Estándar		
Anquilostoma	P. Estándar		
Herpes simplex (<i>Herpesvirus hominis</i>) Encefalitis	P. Estándar		
Herpes simple (<i>Herpesvirus hominis</i>) Mucocutáneo, diseminado o primario, grave	P. de Contacto + P. Estándar	Hasta que las lesiones se sequen y formen costras	
Herpes simple (<i>Herpesvirus hominis</i>) Mucocutáneo, recurrente (piel, oral, genital)	P. Estándar		

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Herpes simplex (<i>Herpesvirus hominis</i>) Neonatal	P. de Contacto + P. Estándar	Hasta que las lesiones se sequen y formen costras	Además, para los bebés asintomáticos expuestos que nacen por vía vaginal o por cesárea y si la madre tiene una infección activa y las membranas se han roto durante más de 4 a 6 horas, hasta que los cultivos de superficie del bebé obtenidos a las 24-36 horas de nacido sean negativos después de 48 horas de incubación

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Herpes zoster (varicela-zoster) (culebrilla) Enfermedad diseminada en cualquier paciente Enfermedad localizada en paciente inmunocomprometido hasta descartar infección diseminada	P. Aéreas Ampliadas o Extendidas + P. de Contacto + P. Estándar	Mientras dure la enfermedad	Los trabajadores sanitarios susceptibles no deben entrar a la habitación si hay trabajadores sanitarios inmunes disponibles; ninguna recomendación para la protección de los trabajadores sanitarios inmunes; no hay recomendaciones sobre el tipo de protección (es decir, barbijo quirúrgico o respirador) para los trabajadores sanitarios susceptibles.

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Herpes zoster (varicela-zoster) (culebrilla) localizado en paciente con sistema inmunológico intacto con lesiones que pueden contenerse o cubrirse	P. Estándar	Hasta que las lesiones se sequen y formen costras	Los trabajadores sanitarios susceptibles no deben brindar atención directa al paciente cuando hay otros trabajadores sanitarios inmunes disponibles
Histoplasmosis	P. Estándar		No se transmite de persona a persona
Virus de la Inmunodeficiencia humana (HIV)	P. Estándar		Quimioprofilaxis postexposición para algunas exposiciones sanguíneas

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Metaneumovirus humano	P. de Contacto + P. Estándar	Mientras dure la enfermedad	Han ocurrido infecciones intrahospitalarias, pero no se ha informado la ruta o forma de transmisión. Se supone que la transmisión se produce por contacto como para el Virus sincicial respiratorio (VSR) ya que los virus están estrechamente relacionados y tienen manifestaciones clínicas y epidemiología similares. Use máscaras, mascarillas o barbijo quirúrgico de acuerdo con las Precauciones estándar.



Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Impétigo	P. de Contacto + P. Estándar	Hasta 24 horas después del inicio de la terapia efectiva	
Mononucleosis infecciosa	P. Estándar		
Influenza humana (Influenza estacional)	P. Estándar		Consultar Prevention Strategies for Seasonal Influenza in Healthcare Settings (Estrategias de prevención para la influenza estacional en entornos de atención médica) para obtener orientación actualizada sobre la influenza estacional (septiembre de 2018).

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Influenza Aviar (Ej. Cepas H5N1, H7, H9)			Para obtener orientación actualizada sobre la influenza aviar, consulte Interim Guidance for Infection Control Within Healthcare Settings When Caring for Confirmed Cases, Probable Cases, and Cases Under Investigation for Infection with Novel Influenza A Viruses Associated with Severe Disease (Guía provisional para el control de infecciones en entornos de atención médica al atender casos confirmados, casos probables y casos bajo investigación de infección con nuevos virus de la influenza A asociados con enfermedades graves) (Septiembre de 2018)

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Influenza Pandémica (también causada por un virus de la influenza humana)	P. Aéreas Especiales + P. Estándar		Para obtener orientación actualizada sobre la influenza pandémica, consultar <u>Interim Guidance for Infection Control Within Healthcare Settings When Caring for Confirmed Cases, Probable Cases, and Cases Under Investigation for Infection with Novel Influenza A Viruses Associated with Severe Disease</u> (Guía provisional para el control de infecciones en entornos de atención médica al atender casos confirmados, casos probables y casos bajo investigación de infección con nuevos virus de la influenza A asociados con enfermedades graves) (Septiembre de 2018)

K

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Síndrome de Kawasaki	P. Estándar		No es una condición infecciosa

L

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Fiebre Lassa (Ver Fiebres virales hemorrágicas)			
Enfermedad de los Legionarios	P. Estándar		No se transmite de persona a persona
Lepra	P. Estándar		
Leptospirosis	P. Estándar		No se transmite de persona a persona
Piojos de la cabeza Pediculosis	P. de Contacto + P. Estándar	Hasta 24 horas después del inicio de la terapia efectiva	Puede hallar información adicional (Setiembre 2018) en el sito “Parásitos” del CDC (Parasites – Lice)

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Piojos del cuerpo	P. Estándar		Se transmite de persona a persona a través de ropa infestada. Use bata o camisolín y guantes. Al quitarse la ropa empáquela y lávela de acuerdo con la guía del CDC, Parásitos – Piojos (Septiembre de 2018 <u>(Parasites – Lice)</u>)
Piojos púbicos	P. Estándar		Se transmite de persona a persona a través del contacto sexual. Consultar la guía del CDC, Parásitos – Piojos (Septiembre de 2018 <u>(Parasites – Lice)</u>)

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Listeriosis (<i>Listeria monocytogenes</i>)	P. Estándar		La transmisión de persona a persona es rara; Se informó transmisión cruzada en entornos neonatales
Enfermedad de Lyme	P. Estándar		No se transmite de persona a persona
Coriomeningitis linfocítica	P. Estándar		No se transmite de persona a persona
Linfogranuloma venéreo	P. Estándar		

M

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Malaria	P. Estándar		No se transmite de persona a persona, excepto a través de transfusiones en raras ocasiones y por no seguir las Precauciones Estándar durante la atención al paciente. Instalar mosquiteros en ventanas y puertas en áreas endémicas. Usar repelentes de mosquitos que contengan DEET y ropa para cubrir las extremidades.
Enfermedad por el virus de Marburgo (ver Fiebres hemorrágicas virales)			
Meliodosis, todas sus formas	P. Estándar		No se transmite de persona a persona

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Sarampión	P. Aéreas Ampliadas o Extendidas + P. Estándar	Hasta 4 días después de la aparición de la erupción; mientras dure la enfermedad en personas inmunodeprimidas	Control provisional de la infección por sarampión [julio del 2019] Consultar las Recomendaciones provisionales para la prevención y el control de infecciones contra el sarampión en entornos de atención médica El personal de salud (PS) susceptible no debe ingresar a la habitación si hay otro PS inmune que se encuentre disponible. Independientemente de la presunta evidencia de inmunidad, el PS debe usar protección respiratoria (al menos con un respirador N95 probado y certificado por NIOSH) al ingresar a la habitación o área de atención del paciente. Para los susceptibles expuestos: vacunar posterior a la exposición dentro de las 72 horas o administrar, cuando esté disponible, inmunoglobulina dentro de los 6 días cuando esté disponible. Colocar a los pacientes susceptibles expuestos bajo Precauciones Aéreas Ampliadas o Extendidas y excluir de su atención al PS

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Meningitis Aséptica (no bacteriano o viral; ver también Infecciones enterovirales)	P. Estándar		Evitar el contacto para bebés y niños pequeños
Meningitis Bacteriana, Entérica, por Gram negativos, en neonatos	P. Estándar		
Meningitis fúngica	P. Estándar		
Meningitis <i>Haemophilus influenzae</i> tipo b, conocido o presunto	P. Aéreas especiales + P. Estándar	Hasta 24 horas después del inicio de la terapia efectiva	

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Meningitis <i>Listeria monocytogenes</i> (Ver Listeriosis)	P. Estándar		
Meningitis <i>Neisseria meningitidis</i> (meningocócica) conocida o presunta	P. Aéreas especiales + P. Estándar	Hasta 24 horas después del inicio de la terapia efectiva	Consultar Enfermedad meningocócica
Meningitis <i>Streptococcus pneumoniae</i>	P. Estándar		
Meningitis Otras bacterias diagnosticadas	P. Estándar		

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Meningitis <i>M. Tuberculosis</i>	P. Estándar		La enfermedad pulmonar concurrente y activa o las lesiones cutáneas con drenaje pueden requerir la adición de Precauciones de Contacto y/o Precauciones de Aire Ampliadas o Extendidas. En el caso de los niños, se deben tomar Precauciones de Aire Ampliadas o Extendidas hasta que se descarte la presencia de tuberculosis activa en los familiares visitantes (ver Tuberculosis)
Enfermedad meningocócica: sepsis, neumonía, meningitis	P. Aéreas Especiales + P. Estándar	Hasta 24 horas después del inicio de la terapia efectiva	Quimioprofilaxis post - exposición para contactos domésticos, trabajadores sanitarios expuestos a secreciones respiratorias; Vacuna post exposición solo para controlar los brotes]

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Molusco contagioso	P. Estándar		
Viruela del mono			Consultar sitio web del CDC sobre viruela símica (mayo del 2022) para obtener información sobre la prevención y el control de infecciones
Mucormicosis	P. Estándar		
Microorganismos multirresistentes (MMR), infección o colonización (por ej., SAMR, ERV, SA con resistencia intermedia o absoluta a la vancomicina, BLEE, <i>S. pneumoniae</i> resistente)	P. de Contacto + P. Estándar		Los MMR son de importancia clínica y epidemiológica. Se recomienda colocar P. de Contacto en entornos con evidencia de transmisión en curso, entornos de cuidados intensivos con mayor riesgo de transmisión o pacientes con heridas que no se pueden contener con apósitos.

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Paperas (parotiditis infecciosa)	P. Aéreas Especiales + P. Estándar	Hasta 5 días después de la aparición de la tumefacción	Paperas [Octubre 2017] El Comité Asesor de Prácticas de Control de Infecciones en el Cuidado de la Salud (HICPAC, por sus siglas en inglés) votó a favor de cambiar la recomendación de aislamiento para las personas con paperas de 9 a 5 días con base en este informe del MMWR del 2008: Recomendaciones actualizadas para el aislamiento de personas con paperas (septiembre del 2018). Después de la aparición de la tumefacción; el PS susceptible no deben brindar atención si hay otro PS inmune disponible

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Micobacterias no tuberculosas (atípicas)			No se transmite de persona a persona
Micobacterias no tuberculosas (atípicas)	Pulmonar o en heridas: P. Estándar		
Neumonía por micoplasmas	P. Aéreas Especiales + P. Estándar	Mientras dure la enfermedad	

N

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Enterocolitis necrotizante	P. Estándar		Precauciones de contacto cuando los casos se agrupan temporalmente
Nocardiosis, lesiones drenantes u otras presentaciones	P. Estándar		No se transmite de persona a persona
Norovirus (ver Gastroenteritis)			
Gastroenteritis por agente de Norwalk (ver Gastroenteritis)			

O

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Orf	P. Estándar		

P

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Infección respiratoria por el virus de la parainfluenza en lactantes y niños pequeños	P. de Contacto + P. Estándar	Mientras dure la enfermedad	La diseminación viral puede prolongarse en pacientes inmunodeprimidos. Fiabilidad de las pruebas de antígenos para determinar cuándo retirar a los pacientes con hospitalizaciones prolongadas de las Precauciones de Contacto inciertas.
Pediculosis (piojos)	P. de Contacto + P. Estándar	Hasta 24 horas después del inicio de la terapia efectiva después del tratamiento	
Infección por oxiuros (enterobiasis)	P. Estándar		

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Parvovirus B19 (Eritema infeccioso)	P. Aéreas Especiales + P. Estándar		Cuando se presenta una enfermedad crónica en un paciente inmunocomprometido, mantener las precauciones mientras dure la hospitalización. Para los pacientes con crisis aplásica transitoria o crisis de glóbulos rojos, mantener las precauciones durante 7 días. La duración de las precauciones para los pacientes inmunodeprimidos con PCR persistentemente positiva no está definida, pero se ha producido transmisión

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Tos ferina	P. Aéreas Especiales + P. Estándar	Hasta 5 días después de la terapia antibiótica efectiva	Se prefiere una habitación individual para el paciente. Cohortizar también puede ser una opción. Administrar quimioprofilaxis posterior a la exposición para contactos domésticos y personal de salud con exposición prolongada a secreciones respiratorias Recomendaciones sobre la vacuna Tdap [2018] Las recomendaciones actuales se pueden encontrar en Tdap / Td ACIP Vaccine Recommendations (septiembre de 2018).

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Peste bubónica (<i>Yersinia pestis</i>)	P. Estándar		
Peste neumocócica (<i>Yersinia pestis</i>)	P. Aéreas Especiales + P. Estándar	Hasta 48 horas después del inicio de la terapia antibiótica efectiva	Profilaxis antimicrobiana para el personal de salud expuesto.
Neumonía Adenovirus	P. Aéreas Especiales + P. de Contacto + P. Estándar	Mientras dure la enfermedad	Se notificaron brotes en entornos pediátricos e institucionales. En huéspedes inmunocomprometidos, prolongar la duración de las P. Aéreas Especiales y las P. de contacto debido a la diseminación prolongada del virus.

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Neumonía Bacterias no enumeradas en otra parte (incluidas las bacterias gramnegativas)	P. Estándar		
Neumonía <i>B. cepacia</i> en pacientes con FQ (fibrosis quística), incluida la colonización de las vías respiratorias	P. de Contacto + P. Estándar	Desconocido	Evite la exposición a otras personas con fibrosis quística. Se prefiere por ello habitación privada (individual) No se han establecido criterios de retiro para las Precauciones de Contacto . Se puede consultar la Guía de la Fundación FQ
Neumonía <i>B. cepacia</i> en pacientes sin FQ (ver MMR)			

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Neumonía <i>Clamidia</i>	P. Estándar		
Neumonía Fúngica	P. Estándar		
Neumonía <i>Haemophilus influenzae</i> , tipo b, Adultos	P. Estándar		
Neumonía <i>Haemophilus influenzae</i> , tipo b, Bebés y Niños	P. Aéreas Especiales + + P. Estándar	Hasta 24 horas después del inicio de la terapia efectiva	
Neumonía <i>Legionella</i>	P. Estándar		

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Neumonía Meningocócica	P. Aéreas Especiales + + P. Estándar	Hasta 24 horas después del inicio de la terapia efectiva	Ver Enfermedad meningocócica
Neumonía Bacterias multirresistentes (ver MMR)			
Neumonía <i>Mycoplasma</i> (neumonía atípica primaria)	P. Aéreas Especiales + + P. Estándar	Mientras dure la enfermedad	
Neumonía Neumonía neumocócica	P. Estándar		Use P. Aéreas Especiales si hay evidencia de transmisión dentro de una unidad de atención al paciente

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Neumonía <i>Pneumocystis jiroveci</i> <i>(Pneumocystis carinii)</i>	P. Estándar		Evite la colocación en la misma habitación con un paciente inmunodeprimido.
Neumonía <i>Staphylococcus aureus</i>	P. Estándar		Para SAMR consultar MMR
Neumonía Estreptococo del grupo A Adultos	P. Aéreas Especiales + + P. Estándar	Hasta 24 horas después del inicio de la terapia efectiva	Ver Enfermedad estreptocócica (estreptococo del grupo A) . Agregar Precauciones de Contacto si se presentan lesiones en la piel.
Neumonía <i>Estreptococo</i> del grupo A Bebés y niños pequeños	P. Aéreas Especiales + + P. Estándar	Hasta 24 horas después del inicio de la terapia efectiva	Agregar Precauciones de Contacto si se presentan lesiones en la piel.

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Neumonía Varicela-Zoster (Ver Varicela-Zoster)			
Neumonía viral Adultos	P. Estándar		
Neumonía viral Lactantes y niños pequeños (ver Enfermedad infecciosa respiratoria , agente viral agudo o específico)			
Poliomielitis	P. de Contacto + + P. Estándar	Mientras dure la enfermedad	Agregar Precauciones de Contacto si se presentan lesiones en la piel.

Q

			Comentarios
Fiebre Q	P. Estándar		

R

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Rabia	P. Estándar		La transmisión de persona a persona es poco frecuente; se ha reportado transmisión a través de trasplantes de córnea, tejidos y órganos. Si el paciente ha mordido a otra persona o la saliva ha contaminado una herida abierta o una membrana mucosa, lave bien el área expuesta y administre profilaxis posterior a la exposición
Fiebre por mordedura de rata (enfermedad por <i>Streptobacillus moniliformis</i> , enfermedad de <i>Spirillum minus</i>)	P. Estándar		No se transmite de persona a persona

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	Comentarios
Fiebre recurrente	P. Estándar		No se transmite de persona a persona
Enfermedad infecciosa respiratoria aguda (si no está cubierta en otra parte) Adultos	P. Estándar		No se transmite de persona a persona
Enfermedad infecciosa respiratoria aguda (si no está cubierta en otra parte) Bebés y Niños pequeños	P. de Contacto + + P. Estándar	Mientras dure la enfermedad	

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Infección por el virus respiratorio sincitial, en lactantes, niños pequeños y adultos inmunodeprimidos	P. de Contacto + + P. Estándar	Mientras dure la enfermedad	Usar máscara, mascarilla o barbijo quirúrgico de acuerdo con las Precauciones Estándar. En pacientes inmunocomprometidos, extender la duración de las Precauciones de Contacto debido a la excreción prolongada en este tipo de pacientes. Fiabilidad de las pruebas de antígenos para determinar cuándo retirar a los pacientes con hospitalizaciones prolongadas de las Precauciones de Contacto inciertas.
Síndrome de Reye	P. Estándar		No es una afección infecciosa
Fiebre reumática	P. Estándar		No es una afección infecciosa

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Rinovirus	P. Aéreas Especiales + P. Estándar	Mientras dure la enfermedad	La vía de transmisión más importante son las gotitas expelidas al hablar, toser, etc. Se han producido brotes en las UCIN y en los centros de atención de pacientes crónicos o de internación prolongada. Agregar Precauciones de Contacto si es probable que ocurran secreciones húmedas copiosas y contacto cercano (por ej., con bebés pequeños)
Fiebres rickettsiales, transmitidas por garrapatas (fiebre maculosa de las Montañas Rocosas, fiebre tifoidea transmitida por garrapatas)	P. Estándar		No se transmite de persona a persona, excepto a través de transfusiones, en raras ocasiones.

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Rickettsialpox (rickettsiosis vesicular)	P. Estándar		No se transmite de persona a persona
Tiña (dermatofitosis, dermatomycosis, tiña)	P. Estándar		En raras ocasiones, se han producido brotes en entornos de atención médica (por ej., UCIN, hospital de rehabilitación). Usar Precauciones de Contacto ante un brote
Fiebre maculosa de las Montañas Rocosas	P. Estándar		No se transmite de persona a persona, excepto a través de transfusiones, en raras ocasiones.
Roseola infantum (exantema subitum; causada por el VHH-6)	P. Estándar		VHH-6 : Virus Herpes Humano Tipo 6
Infección por rotavirus (ver Gastroenteritis)			

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Rubéola (sarampión alemán) (ver también Rubéola congénita)	P. Aéreas Especiales + P. Estándar	Hasta 7 días después de la aparición de la erupción cutánea	El PS susceptible no deben entrar en la habitación si hay PS inmune disponible. No se recomienda el uso de protección facial (por ej., una mascarilla o barbijo quirúrgico si el PS es inmune. Las mujeres embarazadas susceptibles (que no son inmunes) no deben atender a estos pacientes. Administrar la vacuna dentro de los 3 días posteriores a la exposición a personas susceptibles no embarazadas. Colocar a los pacientes susceptibles expuestos en Precauciones Aéreas Especiales; excluir del servicio al PS susceptible desde el día 5 después de la primera exposición hasta el día 21 después de la última exposición, independientemente de que reciba vacuna posterior a la exposición.

S

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Sarna	P. de Contacto + P. Estándar	Hasta 24 horas después del inicio de la terapia efectiva	
Salmonelosis (ver Gastroenteritis)			
Síndrome de la piel escaldada estafilocócica	P. de Contacto + P. Estándar	Mientras dure la enfermedad	Ver Enfermedad estafilocócica, síndrome de piel escaldada
Esquistosomiasis (bilharziasis)	P. Estándar		
Esporotricosis	P. Estándar		

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Síndrome respiratorio agudo severo (SARS)	P. Aéreas Ampliadas o Extendidas + P. de Contacto + P. Estándar	Mientras dure la enfermedad más 10 días después de la resolución de la fiebre, siempre que los síntomas respiratorios estén ausentes o mejoren	Se prefieren las Precauciones Aéreas Ampliadas o Extendidas, si no fuera posible porque no hay disponible una habitación adecuada a este tipo de precauciones, utilizar Precauciones Aéreas Especiales.. Usar protección respiratoria N95 o superior; mascarilla o barbijo quirúrgica si no se dispone de N95; protección ocular (gafas, protector facial). Los procedimientos generadores de aerosoles y los "superexcretadores" tienen el mayor riesgo de transmisión a través de núcleos de gotas pequeñas y gotas grandes.

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Shigelosis (Ver Gastroenteritis)			
Viruela (variola; ver Vaccinia para el manejo de las personas vacunadas)	P. Aéreas Ampliadas o Extendidas + P. de Contacto + P. Estándar	Mientras dure la enfermedad	Hasta que todas las costras se hayan formado y separado (3-4 semanas). El PS no vacunado no deben proporcionar atención cuando se dispone de PS inmune. Usar protección respiratoria N95 o superior para personas susceptibles y vacunadas con éxito; Vacuna posterior a la exposición: dentro de los 4 días posteriores a la exposición
Enfermedad menor de <i>Spirillum</i> (fiebre por mordedura de rata)	P. Estándar		No se transmite de persona a persona

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Enfermedad estafilocócica (<i>S. aureus</i>) Piel, herida o quemadura Destacado	P. de Contacto + P. Estándar	Mientras dure la enfermedad	Hasta que el drenaje se detenga o se pueda contener con vendajes
Enfermedad estafilocócica (<i>S. aureus</i>) Piel, herida o quemadura Menor o limitado	P. Estándar		Si el apósito cubre y contiene el drenaje adecuadamente
Enfermedad estafilocócica (<i>S. aureus</i>) Enterocolitis	P. Estándar		Usar Precauciones de Contacto para niños con pañales o incontinentes mientras dure la enfermedad
Enfermedad estafilocócica (<i>S. aureus</i>) Multirresistente (ver MMR)			

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Enfermedad estafilocócica (<i>S. aureus</i>) Neumonía	P. Estándar		
Enfermedad estafilocócica (<i>S. aureus</i>) Síndrome de piel escaldada	P. de Contacto + P. Estándar	Mientras dure la enfermedad	Considerar al PS como una fuente potencial de brote en la UCIN
Enfermedad estafilocócica (<i>S. aureus</i>) Síndrome de shock tóxico	P. Estándar		
<i>Enfermedad por Streptobacillus moniliformis</i> (fiebre por mordedura de rata)	P. Estándar		No se transmite de persona a persona

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Enfermedad estreptocócica <i>(estreptococo del grupo A)</i> Piel, herida o quemadura Destacado	P. Aéreas Especiales + P. de Contacto + P. Estándar	Hasta 24 horas después del inicio de la terapia efectiva	Hasta que el drenaje se detenga o se pueda contener con vendajes
Enfermedad estreptocócica <i>(estreptococo del grupo A)</i> Piel, herida o quemadura Menor o Limitado	P. Estándar		Si el apósito cubre o contiene el drenaje
Enfermedad estreptocócica <i>(estreptococo del grupo A)</i> Endometritis Fiebre puerperal	P. Estándar		

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Enfermedad estreptocócica (<i>estreptococo</i> del grupo A) Faringitis en lactantes y niños pequeños	P. Aéreas Especiales + P. Estándar	Hasta 24 horas después del inicio de la terapia efectiva	
Enfermedad estreptocócica (<i>estreptococo</i> del grupo A) Neumonía	P. Aéreas Especiales + P. Estándar	Hasta 24 horas después del inicio de la terapia efectiva	
Enfermedad estreptocócica (<i>estreptococo</i> del grupo A) Escarlatina en lactantes y niños pequeños	P. Aéreas Especiales + P. Estándar	Hasta 24 horas después del inicio de la terapia efectiva	

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Enfermedad estreptocócica <i>(estreptococo del grupo A)</i> Enfermedad invasiva grave	P. Aéreas Especiales + P. Estándar	Hasta 24 horas después del inicio de la terapia efectiva	Se han producido brotes de enfermedades invasivas graves secundarias a la transmisión entre pacientes y personal sanitario. Agregar Precauciones de Contacto para drenar la herida. Seguir las recomendaciones de profilaxis antimicrobiana en condiciones seleccionadas
Enfermedad estreptocócica <i>(estreptococo del grupo B),</i> neonatal	P. Estándar		
Enfermedad estreptocócica (no del grupo A o B) Multirresistentes (ver MMR)			

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Estrongiloidiasis	P. Estándar		
Sífilis Latente (terciario) y seropositividad sin lesiones	P. Estándar		
Sífilis Piel y membranas mucosas, incluidas las congénitas, primarias, secundarias	P. Estándar		

T

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Enfermedad de la tenia <i>Hymenolepis nana</i>	P. Estándar		No se transmite de persona a persona
Enfermedad de la tenia <i>Taenia solium</i> (carne de cerdo)	P. Estándar		
Enfermedad de la tenia Otro	P. Estándar		
Tétanos	P. Estándar		No se transmite de persona a persona
Tiña (por ej., dermatofitosis, dermatomicosis, tiña)	P. Estándar		Episodios raros de transmisión de persona a persona
Tracoma agudo	P. Estándar		

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Toxoplasmosis	P. Estándar		La transmisión de persona a persona es poco frecuente; la transmisión vertical de madre a hijo, la transmisión a través de órganos y las transfusiones de sangre también son poco frecuentes.
Síndrome de shock tóxico (enfermedad estafilocócica, enfermedad estreptocócica)	P. Estándar		Precauciones Aéreas Especiales durante las primeras 24 horas después de la implementación de la terapia antibiótica si el <i>estreptococo</i> del grupo A es una etiología probable
Encefalopatía espongiforme transmisible (ver Enfermedad de Creutzfeld-Jacob, ECJ, vECJ)			

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Boca de trinchera (angina de Vincent)	P. Estándar		
Triquinosis	P. Estándar		
Tricomoniasis	P. Estándar		
Trichuriasis (Enfermedad del tricocéfalo)	P. Estándar		
Tuberculosis (M. tuberculosis) Lesión extrapulmonar y drenante	P. Aéreas Ampliadas o Extendidas + P. de Contacto + P. Estándar		Suspender las precauciones solo cuando el paciente esté mejorando clínicamente y el drenaje haya cesado o haya 3 cultivos negativos consecutivos del drenaje continuo.Examinar en busca de evidencia de tuberculosis pulmonar activa

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Tuberculosis (M. tuberculosis) Extrapulmonar, sin lesión, drenante Meningitis	P. Estándar		Examinar en busca de evidencia de tuberculosis pulmonar. En el caso de lactantes y niños, usar Precauciones Aéreas Ampliadas o Extendidas hasta que se descarte la presencia de tuberculosis pulmonar activa en los miembros de la familia que visitan al paciente
Tuberculosis (M. tuberculosis) Enfermedad pulmonar o laríngea confirmada	P. Aéreas Ampliadas o Extendidas + P. Estándar		Suspender las precauciones solo cuando el paciente que recibe una terapia eficaz esté mejorando clínicamente y tenga 3 frotis consecutivos de esputo negativos para bacilos acidorresistentes recolectados en días separados (MMWR 2005; 54: RR-17 Guidelines for Preventing the Transmission of Mycobacterium tuberculosis in Health-Care Settings, 2005) (Update septiembre de 2018)

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Tuberculosis (<i>M. tuberculosis</i>) Sospecha de Enfermedad pulmonar o laríngea confirmada	P. Aéreas Ampliadas o Extendidas + P. Estándar		Suspender las precauciones solo cuando la probabilidad de enfermedad de tuberculosis infecciosa se considere insignificante, o hay otro diagnóstico que explica el síndrome clínico, o los resultados de 3 frotis de esputo para BAAR son negativos. Cada una de las 3 muestras de esputo debe recolectarse con un intervalo de 8 a 24 horas, y al menos 1 debe ser una muestra temprano en la mañana
Tuberculosis (<i>M. tuberculosis</i>) Prueba cutánea positiva sin evidencia de enfermedad activa actual	P. Estándar		

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Tularemia Lesión drenante	P. Estándar		No se transmite de persona a persona
Tularemia Pulmonar	P. Estándar		No se transmite de persona a persona
Fiebre tifoidea (<i>Salmonella typhi</i>) (ver Gastroenteritis)			
Tifus <i>Rickettsia prowazekii</i> (tifus epidémico o transmitido por piojos)	P. Estándar		Se transmite de persona a persona a través del contacto personal cercano o de la ropa
Tifus <i>Rickettsia typhi</i>	P. Estándar		No se transmite de persona a persona

U

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Infección del tracto urinario (incluyendo pielonefritis), con o sin catéter urinario	P. Estándar		

v

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Varicela Zóster	P. Aéreas Ampliadas o Extendidas + P. de Contacto + P. Estándar	Hasta que las lesiones se sequen y formen costra	El PS susceptible no debe entrar en la habitación del paciente si hay otro PS inmune disponible. No se recomienda la protección facial del PS si es inmune. No hay recomendaciones acerca del tipo de protección (mascarilla o barbijo quirúrgico versus respirador N95) para el PS susceptible. En el huésped inmunodeprimido con neumonía por varicela, prolongar la duración de las precauciones y extenderla mientras dure toda la enfermedad.

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Varicela Zóster	P. Aéreas Ampliadas o Extendidas + P. de Contacto + P. Estándar	Hasta que las lesiones se sequen y formen costra	Actualización sobre profilaxis posterior a la exposición a la varicela [abril de 2019] Profilaxis postexposición: proporcionar la vacuna post - exposición lo antes posible, pero dentro de las 120 horas. En el caso de las personas expuestas susceptibles para las que la vacuna está contraindicada (personas inmunodeprimidas, mujeres embarazadas, recién nacidos cuyo inicio de la varicela de la madre es de menos de 5 días antes del parto o dentro de las 48 horas posteriores al parto), proporcionar inmunoglobulina contra la varicela zóster tan pronto como sea posible después de la exposición y dentro de los 10 días

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Varicela Zóster	P. Aéreas Ampliadas o Extendidas + P. de Contacto + P. Estándar	Hasta que las lesiones se sequen y formen costra	Usar Precauciones Aéreas Ampliadas o Extendidas para personas susceptibles expuestas y excluir al PS susceptible expuesto a partir de 8 días después de la primera exposición hasta 21 días después de la última exposición o 28 si recibió inmunoglobulina contra varicela zóster, independientemente de la vacunación posterior a la exposición
Viruela (ver Viruela)			
<i>Vibrio parahaemolyticus</i> (ver Gastroenteritis)			
Angina de Vincent (boca de trinchera)	P. Estándar		



Comentarios

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	
Fiebres hemorrágicas virales debidas a los virus de Lassa, Ébola, Marburgo y fiebre de Crimea-Congo	P. Aéreas Especiales + P. de Contacto + P. Estándar	Mientras dure la enfermedad	Enfermedad por el virus del Ébola para trabajadores de la salud [2014] Actualización: Las recomendaciones para los trabajadores de la salud se pueden encontrar en Ébola para médicos. (septiembre de 2018). Se prefiere habitación para un solo paciente. Recomendaciones: • Usar dispositivos de seguridad para objetos punzantes y prácticas de trabajo seguras; • Higiene de manos; • Protección de barrera contra la sangre y los fluidos corporales al entrar en la habitación (guantes individuales y bata resistente a los fluidos o impermeable, protección facial/ocular con máscaras, gafas o protectores faciales);

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Fiebres hemorrágicas virales debidas a los virus de Lassa, Ébola, Marburgo y fiebre de Crimea-Congo	P. Aéreas Especiales + P. de Contacto + P. Estándar	Mientras dure la enfermedad	• Manejo adecuado de los residuos • Usar respiradores N95 o superiores cuando realicen procedimientos que generen aerosoles. • La carga viral es más grande en las etapas finales de la enfermedad, cuando puede ocurrir una hemorragia; se puede usar EPP adicionales, incluidos guantes dobles, cubre-piernas y zapatos, especialmente en entornos de recursos limitados donde las opciones de limpieza y lavandería son limitadas. • Notifique inmediatamente a los funcionarios de salud pública si se sospecha de la presencia de la enfermedad del Ébola



Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Infecciones de heridas Destacada	P. de Contacto + P. Estándar	Mientras dure la enfermedad	Hasta que el drenaje se detenga o se pueda contener con vendajes
Infecciones de heridas Menor o limitada	P. Estándar		Si el apósito cubre y contiene el drenaje

Y

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Yersinia enterocolítica Gastroenteritis (ver Gastroenteritis)			

Z

Infección / Afección	Tipo de Precaución	Duración de las Precauciones	 Comentarios
Zóster (varicela-zóster) (ver Herpes zóster)			
Zigomicosis (ficomicosis, mucormicosis)	P. Estándar		No se transmite de persona a persona

Última revisión: 22 de julio de 2019

Fuente del contenido: [Centros para el Control](#) y la Prevención de Enfermedades, [Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas Emergentes y Zoonóticas \(NCEZID\)](#), [División de Promoción de la Calidad de la Atención Médica \(DHQP\)](#)